COUVERT par
la majorité des régimes
d'assurance privés ET PUBLICS
PARTOUT AU CANADA
(des restrictions peuvent s'appliquer)^{2*}

59,1 MILLIONS
de patients traités par
TRINTELLIX à l'échelle mondiale,
et ce n'est pas fini^{3†‡}

† Portée clinique inconnue.
‡ La durée approximative du traitement variait entre 3 mois et 2 ans.

TRINTELLIX

- Posologie pratique : 1 fois par jour¹
- Peut se prendre avec ou sans nourriture¹

5 mg

On peut envisager
de réduire la dose à un
minimum de **5 mg** 1 fois
par jour chez les patients
qui ne tolèrent pas une
dose plus élevée¹.

POSOLOGIE DE DÉPART ET POSOLOGIE RECOMMANDÉE

10 mg

10 mg
1 fois par jour
chez les patients
de moins de
65 ans¹

20 mg

Selon la réponse du
patient, la dose peut être
portée à un maximum
de **20 mg** 1 fois par jour,
pour autant qu'elle soit
bien tolérée¹.

- Posologie de départ de **5 mg** 1 fois par jour
chez les patients de **65 ans ou plus**¹
 - L'utilisation d'une dose supérieure à 10 mg par jour chez la personne âgée commande la prudence compte tenu du peu de données sur l'efficacité et l'innocuité dont on dispose chez les patients de 65 ans ou plus ayant reçu ces doses lors d'essais cliniques comparatifs.

Pour en savoir plus sur TRINTELLIX et ses options
posologiques, visitez trintellix.ca/fr/dosing.

* TRINTELLIX est couvert par les Services de santé non assurés, Anciens Combattants Canada et le Service correctionnel du Canada, ainsi que par les listes de médicaments des provinces et des territoires suivants : Québec, Ontario, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Colombie-Britannique (autorisation spéciale). Consultez les listes de médicaments provinciales pour de plus amples renseignements.

Usage clinique :

Efficacité quant au soulagement des symptômes du TDM démontrée dans le cadre d'essais cliniques d'au plus 8 semaines; efficacité quant au maintien de la réponse antidépressive démontrée pendant une période pouvant atteindre 24 semaines.

Le médecin qui opte pour un traitement prolongé par TRINTELLIX doit périodiquement réévaluer l'utilité de ce traitement chez son patient.

Chez les personnes âgées (≥ 65 ans), le traitement doit toujours être amorcé à la plus faible dose efficace, soit 5 mg/jour.

Non indiqué dans la population pédiatrique.

Contre-indication :

- Utilisation concomitante d'un inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO)

Mises en garde et précautions les plus importantes :

Risque accru d'acte d'automutilation, de comportement agressif à l'égard d'autrui ainsi que de pensées et comportements suicidaires : il faut être à l'affût d'une aggravation clinique et de l'apparition de comportements de type agitation et de pensées et comportements suicidaires.

Autres mises en garde et précautions pertinentes :

- Dépendance/tolérance
- Symptômes de retrait
- Prudence en cas de conduite automobile et d'utilisation de machines
- Saignements anormaux
- Possibilité d'un risque accru d'hémorragie post-partum
- Prudence en cas d'insuffisance hépatique

modérée ou sévère

- Risque de fracture osseuse
- Prudence chez les patients ayant des antécédents de crises convulsives ou souffrant d'épilepsie instable
- Toxicité sérotoninergique/syndrome malin des neuroleptiques
- Perturbations cognitives et motrices
- Glaucome à angle fermé
- Prudence chez les patients ayant des antécédents d'accès maniaques ou hypomaniaques, et interruption du traitement chez tout patient qui entre en phase maniaque
- Agressivité/agitation
- Prudence en cas d'usage concomitant de la thérapie électroconvulsive (TEC)
- Hyponatrémie
- Prudence en cas d'insuffisance rénale sévère
- Dysfonctions sexuelles
- Utilisation non recommandée durant l'allaitement
- Ajustement posologique chez les patients âgés

Pour de plus amples renseignements :

Consultez la monographie du produit au www.trintellixmonographie.ca. Vous y trouverez des renseignements importants sur les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d'utilisation clinique dont il n'est pas question dans le présent document.

Vous pouvez aussi vous procurer la monographie du produit en appelant au 1-800-586-2325.

Références : 1. Monographie de TRINTELLIX. Lundbeck Canada Inc., 27 mai, 2024. 2. Données internes : Couverture de TRINTELLIX au Canada. Lundbeck. Décembre 2021. 3. Données internes. Lundbeck Canada Inc. Avril 2024.

CA-TRIN-0391-F

© 2024 Lundbeck. Tous droits réservés.

Trintellix^{MD} est une marque déposée de H. Lundbeck A/S, employée sous licence par Lundbeck Canada Inc.